التقرير الوبائي (2022/08/04)

الوضع الوبائي العالمي

عالميا سجلت منظمة الصحة العالمية انخفاض في عدد الحالات هذا الاسبوع مع استقرار في عدد الوفيات المسجلة مقارنتا بالاسبوع الماضي . في حين يستمر تباطء انتشار المرض في اغلب مناطق العالم لا تزال دول منطقة غرب المحيط الهادي تشهد ارتفاع في عدد الحالات .كذلك سجلت منطقة شرق المتوسط انخفاض في عدد الحالات هذا الاسبوع بلغ 12 % عما سجل الاسبوع الماضي ورافق هذا ارتفاع في عدد الوفيات بلغ 26 % عما سجل الاسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع عدد الوفيات في كل من ايران وتونس والعراق.

دول نقاط العبور (Trauel Corridor Covntries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مو	التغير الاسبوعي(WK3
ليبيا	37	468%
تونس	70	-58 %
مصر	-	-
الجزائر	3	182%
السودان	>1	-
تشاد	>1	-
النيجر	>1	-
تركيا	-	-

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية تباطء في انتشار المرض حيث بلغت نسبة الحالات الموجبة 27 %. وقد تزامن هذا مع انخفاض في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 39- % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية **505,611** حالة و عدد الوفيات **6,433** حالة وفاة . واعتماداً على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **ستة حالات** يوميا.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 399 اختبار يوميا وقد رافق ذلك انخفاض في عدد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 144 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بلغ 24- % . و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة اعلى 35 % نهاية هذا الاسبوع.

وسجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني حالتين هذا الاسبوع مع استقرار مؤشر معدل الوفيات (CFR) 1.34%.



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

تستمر الموجة الحالية للمرض في الانتشار لتصل الى 12 منطقة صحية تضم الغرب والشرق والجنوب الليبي. وباستثناء منطقة طرابلس لم تتخطى اي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 الف مواطن .



المنطقة	29/07	30/07	31/07	01/08	02/08	03/08	04/08
طبرق	0	0	0	0	0	0	0
درنة	0	0	0	0	0	0	0
الجبل الأخضر	0	0	0	0	0	0	0
المرج	0	0	0	0	0	0	0
بنغازي	0	0	0	0	0	0	0
اجدابيا والملواحات	3	3	0	0	0	0	0
الكفرة	7	7	7	7	4	4	0
سرت	1	1	1	3	3	4	5
مصراته	8	9	7	9	5	8	6
المرقب	17	16	13	13	11	13	11
طرابلس	60	55	51	49	50	50	44
الجفارة	0	0	0	0	0	0	0
للزاوية	21	23	28	30	30	33	28
المنطقة الغربية	23	21	15	22	23	19	18
الجبل الغربي	4	2	3	2	2	2	2
نالوت	15	12	5	6	7	4	4
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	8	10	11	9	9	8	5
وادي الحياة	1	2	1	1	1	1	1
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	0	0	0	0	0	0	0

المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة.

نتيجة لارتفاع عدد الحالات المسجلة في طرابلس وانخفاض عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يوميا و اغلاق اغلب مراكز العزل في المنطقة تم تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث في يستمر تصنيف باقي المناطق على المستوى الوبائي الثاني.



الخـــلاصـــــة

- **استمرار استقرارالوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطء معدلات انتشار المرض عن الاسبوع الماضي** وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - انخفاض مؤشر التغيير الاسبوعي (WEEKLY CHANGE) لهاذا الاسبوع خاصةفي مدينة طرابلس و المناطق المجاورة
  - انخفاض مؤشر عدد التكاثر الى اقل من (1.0) نهاية هذا الاسبوع
  - استقرار المعدل الاسبوعي لنسبة الحالات الموجبة على 35%
  - استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشياً مع نمط انتشار المتحور اوميكرون.
- **تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث يدعوا الى فرض بعض الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.**
- انخفاض عدد الاختبارات الى اقل من 50 اختبار لكل 100 الف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الامراض من رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء

التوصيات :

- **إعادة فرض الاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الاماكن العامة و التباعد الجسدي في منطقة طرابلس.**
- سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التى تجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة اجهزة المركز في الكشف عن الحالات .
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر .
- اعادة تاهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس و دعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- تكثيف حملات التطعيم والتوعية