
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الخامس عشر للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (1,769) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/14 (1,866) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (46) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 3 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/14 (61) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 3 %.

3. بلغ عدد الوفيات (3) حالات وفاة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/14 (4) حالات وفاة.

4. زاد عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,214,303) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,140,236) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (96,813) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
501,873	4,522	490,925	6,426	% 1	جرعة أولى: 2,214,303 جرعة ثانية: 1,140,236 جرعة تعزيزية: 96,813

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/15) مقارنة بالأسبوع (2022/14):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/14	1769	46	213	3	% 3
الأسبوع 2022/14	1866	62	403	4	↓ % 3

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 15/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	11	12	13	14	15	16	17
عدد الحالات	9	1	15	10	---	1	10

أعلى حالات مؤكدة يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022 : (15 حالة مؤكدة).

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 14 / 2022	% 5	% 2	% 5
الأسبوع 14 / 2022	% 4	% 3	% 4


❖ حالات الشفاء خلال الأسبوع 15/ 2022:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 213 حالة.

❖ حالات الوفاة خلال الأسبوع (2022/15) مقارنة بالأسبوع (2022/14) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 15 / 2022	1	2	0	3
الأسبوع 14 / 2022	2	2	0	4







❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة
الأسبوع 2022/15	الأسبوع 2022/14		الأسبوع 2022/15	الأسبوع 2022/14	
4	0	صبراتة	17	35	طرابلس
0	10	الزاوية الغرب	8	4	بنغازي
0	1	السبيعة	1	0	جنزور
0	1	زوارة	1	0	صرمان
0	0	وادي عتبة	2	0	قصر بن غشير
3	2	غدامس	0	2	زليتن
1	0	تراغن	3	3	الزاوية المركز
1	1	غريان	5	3	سبها

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض