
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي السادس عشر للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**1,519**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/15** (**1,769**) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (**33**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **2 %** ، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/15** (**46**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **3 %.**

3. لم يتم تسجيل حالات وفيات لهذا الأسبوع.

4. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**2,214,875**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**1,141,034**) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**97,630**) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
501,906	4,493	490,987	6,426	% 1	جرعة أولى: 2,214,875 جرعة ثانية: 1,141,034 جرعة تعزيزية: 97,630

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/16) مقارنة بالأسبوع (2022/15):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/16	1519	33	62	0	↓ % 2
الأسبوع 2022/15	1769	46	213	3	% 3

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 16/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	18	19	20	21	22	23	24
عدد الحالات	2	3	10	16	---	0	2

أعلى حالات مؤكدة يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 : (16 حالة مؤكدة).

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 16 / 2022	% 2	% 1	% 0
الأسبوع 15 / 2022	% 5	% 2	% 5

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 15/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 62 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/16) **مقارنة بالأسبوع** (2022/15) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 16 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 15 / 2022	1	2	0	3



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/15	الأسبوع 2022/16		الأسبوع 2022/15	الأسبوع 2022/16
طرابلس	17	12	قصر بن غشير	2	0
بنغازي	8	0	الزاوية المركز	3	0
مصراته	0	1	سبها	5	0
جنزور	1	0	صبراتة	4	3
صرمان	1	1	غدامس	3	4
غريان	1	0	تراغن	1	0
البيضاء	0	12			

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض