
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الثامن عشر للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (755) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/17 (945) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (16) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/17 (7) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 1 %.

3. لم يتم تسجيل حالات وفيات لهذا الأسبوع.

4. زاد عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,215,144) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,141,412) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (97,764) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
501,931	4,461	491,044	6,426	% 1	جرعة أولى: 2,215,144 جرعة ثانية: 1,141,412 جرعة تعزيزية: 97,764

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/18) مقارنة بالأسبوع (2022/17):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/18	755	16	7	0	% 2
الأسبوع 2022/17	945	7	50	0	% 1

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 18/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	2	3	4	5	6	7	8
عدد الحالات	0	0	0	0	---	8	8

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 18 / 2022	% 0	% 1	% 1
الأسبوع 17 / 2022	% 0	% 1	% 0

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 18/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 7 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/18) **مقارنة بالأسبوع** (2022/17) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 17 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 16 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/17	الأسبوع 2022/18		الأسبوع 2022/17	الأسبوع 2022/18
طرابلس	2	4	سرت	1	0
صبراتة	3	4	سبها	0	1
زليتن	1	0	القلعة	0	7

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض