
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي التاسع عشر للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**1706**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/18** (**755**) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (**29**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **2 %** ، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/18** (**16**) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية **2 %.**

3. لم يتم تسجيل حالات وفيات لهذا الأسبوع.

4. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**2,215,855**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**1,141,938**) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**98,414**) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
501,960	4,485	491,049	6,426	% 1	جرعة أولى: 2,215,855 جرعة ثانية: 1,141,938 جرعة تعزيزية: 98,414

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/19) مقارنة بالأسبوع (2022/18):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/19	1706	29	5	0	% 2
الأسبوع 2022/18	755	16	7	0	% 2

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 19/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	9	10	11	12	13	14	15
عدد الحالات	1	7	8	3	---	8	2

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 19 / 2022	% 0	% 1	% 2
الأسبوع 18 / 2022	% 0	% 1	% 1

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 18/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 5 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/19) **مقارنة بالأسبوع** (2022/18) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 19 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 18 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/18	الأسبوع 2022/19		الأسبوع 2022/18	الأسبوع 2022/19
طرابلس	4	17	الزاوية المركز	0	4
صبراتة	4	1	سبها	1	4
زليتن	0	1	القلعة	7	0

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض