# ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الثالث للعام 2022

(2022 / 1 / 23 - 17)


1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (**42,723**) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/2** (**31,011**) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (**9,703**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **23 %**، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/2** (**4,072**) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية **13 %**.

3. بلغ عدد الوفيات (**83**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (**1 %**)، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/2** (**57**) حالة وفاة وبمعدل إماتة (**1 %**).

4. ارتفاع عدد الحالات الموجبة في المدن: طرابلس، بنغازي، مصراتة، جنزور، القره بوللي، صرمان، يفرن، قصر بن غشير، بني وليد، زليتن، الخمس، سرت، سبها، ترهونة، المايه، الزنتان، الزاوية الغرب، السبيعة، زوارة، ظاهر الجبل، غدامس، مسلاتة، الغريفة، الجفرة، غات والبيضاء ، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/2**.

5. زاد عدد المطعمين ضد فيروس **COVID-19** بالجرعة الأولى (**1,998,817**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**967,663**) مطعم، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**12,035**) مطعم، مقارنة بالأسبوع الوبائي **2022/2** حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى (**1,965,713**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (**940,217**) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (**4,166**) مطعم.




## ❖ الاحصائيات التراكمية

| الحالات المؤكدة | الحالات النشطة | حالات الشفاء | حالات الوفاة | معدل الوفيات | عدد المطعمين |
|---|---|---|---|---|---|
| 407,758 | 13,234 | 388,588 | 5,936 | % 1 | جرعة أولى: 1,998,817<br>جرعة ثانية: 967,663<br>جرعة تعزيزية: 12,035 |

## ❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/3) مقارنة بالأسبوع (2022/2):

| | العينات المفحوصة | الحالات المؤكدة | حالات الشفاء | حالات الوفاة | معدل الإيجابية |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 2022/3 | 42723 | 9703 | 3513 | 83 | ↑ % 23 |
| الأسبوع 2022/2 | 31011 | 4072 | 3804 | 57 | ↑ % 13 |

## ❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 2/ 2022:

| أيام الأسبوع | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| عدد الحالات | 855 | 1173 | 1331 | 1700 | -- | 2281 | 2333 |

أعلى حالات مؤكدة يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 : (2333 حالة مؤكدة).

## ❖ معدل الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


| | المنطقة الشرقية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية |
|---|---|---|---|
| الأسبوع 3 / 2022 | % 17 | % 22 | % 13 |
| الأسبوع 2 / 2022 | % 13 | % 9 | % 10 |


❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 3/ 2022:


إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 3513 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/3) **مقارنة بالأسبوع** (2022/2) :

| | المنطقة الشرقية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية | المجموع | معدل الإماتة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 3 / 2022 | 22 | 61 | 0 | 83 | % 1 |
| الأسبوع 2 / 2022 | 20 | 36 | 1 | 57 | % 1 |



## ❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

| المدينة | عدد الحالات المؤكدة | | المدينة | عدد الحالات المؤكدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| | الأسبوع 2022/2 | الأسبوع 2022/3 | | الأسبوع 2022/2 | الأسبوع 2022/3 |
| طرابلس | 2615 | 6826 | الزاوية الغرب | 68 | 258 |
| بنغازي | 20 | 32 | نالوت | 12 | 13 |
| مصراته | 137 | 288 | السبيعة | 42 | 94 |
| جنزور | 82 | 153 | زوارة | 20 | 90 |
| القره بوللي | 61 | 183 | ظاهر الجبل | 22 | 49 |
| صرمان | 81 | 127 | غدامس | 0 | 16 |
| يفرن | 28 | 45 | تازربو | 2 | 0 |
| قصر بن غشير | 48 | 153 | جادو | 0 | 1 |
| بني وليد | 31 | 115 | مسلاتة | 104 | 125 |
| زليتن | 100 | 137 | العجيلات | 5 | 9 |
| الخمس | 81 | 86 | الغريفة | 0 | 13 |
| سرت | 10 | 81 | الشاطئ | 0 | 3 |
| الزاوية المركز | 179 | 176 | تراغن | 1 | 1 |
| الرياينة | 11 | 8 | غريان | 47 | 53 |
| سبها | 9 | 24 | كاباو | 0 | 1 |
| ترهونة | 52 | 146 | باطن الجبل | 1 | 2 |
| الماية | 28 | 112 | القلعة | 1 | 10 |
| الزنتان | 73 | 111 | الواحات | 0 | 7 |
| العامرية | 3 | 7 | السايح | 1 | 1 |
| الرجبان | 0 | 2 | الجفرة | 1 | 12 |
| درج | 1 | 1 | الحرابة | 1 | 0 |
| الرحيبات | 1 | 1 | العوينية | 0 | 2 |
| سواني بن ادم | 0 | 7 | اجدابيا | 1 | 0 |
| صبراتة | 45 | 51 | غات | 0 | 10 |
| درنة | 4 | 5 | الأبيار | 0 | 7 |
| تاورغاء | 0 | 1 | الزهراء | 13 | 0 |
| شحات | 1 | 7 | القبة | 4 | 0 |
| العزيزية | 0 | 2 | البيضاء | 25 | 38 |
| القطرون | 0 | 1 | | | |

# إرشادات الوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

**For contact us:**

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

**Email:** ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

**Facebook/**إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض