
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي السابع والثلاثون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (610) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/36 (775) عينة.
2. عدد الحالات المؤكدة (34) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 6 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/36 (38) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 5 %.
3. لم يتم التبليغ عن حالات وفاة لهذا الأسبوع.
4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,304,405) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,228,692) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (176,108) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية:

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
506,932	21	500,474	6,437	% 1	جرعة أولى: 2,304,405 جرعة ثانية: 1,228,692 جرعة تعزيزية: 176,108

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/37) مقارنة بالأسبوع (2022/36):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/37	610	34	68	0	↑ % 6
الأسبوع 2022/36	775	38	121	0	% 5

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 37/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	12	13	14	15	16	17	18
عدد الحالات	0	11	9	4	---	4	6

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يوم الثلاثاء (11 حالة)

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 37 / 2022	% 0	% 5	% 4
الأسبوع 36 / 2022	% 0	% 5	% 4

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 37/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 68 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/37) **مقارنة بالأسبوع** (2022/36) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 37 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 36 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/36	الأسبوع 2022/37		الأسبوع 2022/36	الأسبوع 2022/37
طرابلس	34	25	الزاوية المركز	1	5
مصراته	1	0	سبها	2	3
الشاطئ	0	1			

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (**1.5 – 2** متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض