
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الحادي والأربعون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (370) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/40 (338) عينة.
2. عدد الحالات المؤكدة (12) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 3 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/40 (7) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 2 %.
3. لم يتم التبليغ عن حالات وفاة لهذا الأسبوع.
4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,308,724) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,229,888) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (177,468) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية:

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
507,024	40	500,984	6,437	% 1	جرعة أولى: 2,308,724 جرعة ثانية: 1,229,888 جرعة تعزيزية: 177,468

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/41) مقارنة بالأسبوع (2022/40):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/41	370	12	16	0	↑ % 3
الأسبوع 2022/40	338	7	14	0	↓ % 2

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 41/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	10	11	12	13	14	15	16
عدد الحالات	0	0	2	2	---	3	5

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يوم الاحد (5 حالات)

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الأسبوع 41 / 2022	% 0	% 3	% 3
الأسبوع 40 / 2022	% 0	% 2	% 2

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 41/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 16 حالة.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/41) **مقارنة بالأسبوع** (2022/40) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 41 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 40 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/40	الأسبوع 2022/41		الأسبوع 2022/40	الأسبوع 2022/41
طرابلس	5	5	القطرون	1	0
سبها	1	2	صبراتة	0	5

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (**1.5 – 2** متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض