
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الثامن والأربعون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (151) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/47 (120) عينة.

2. عدد الحالات المؤكدة (16) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 11 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/47 (6) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 5 %.

3. لم يتم التبليغ عن حالات وفاة لهذا الأسبوع.

4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,308,724) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,229,888) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (177,468) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية:

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
507,100	57	500,606	6,437	% 1	جرعة أولى: 2,308,724 جرعة ثانية: 1,229,888 جرعة تعزيزية: 177,468

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/48) مقارنة بالأسبوع (2022/47):

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/48	151	16	6	0	↑ % 11
الأسبوع 2022/47	120	6	2	0	↑ % 5

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 48/ 2022:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	28	29	30	1 ديسمبر	2	3	4
عدد الحالات	1	6	6	0	---	3	0

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يومي الثلاثاء والاربعاء (6 حالات)

❖ نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الاسبوع 48 / 2022	% 0	% 11	% 0
الاسبوع 47 / 2022	% 0	% 5	% 0

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع** 48/ 2022:

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 6 حالات.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع** (2022/48) **مقارنة بالأسبوع** (2022/47) :

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 48 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 47 / 2022	0	0	0	0



❖ **توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي**:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/47	الأسبوع 2022/48
طرابلس	5	14
زليتن	1	0
صبراتة	0	2

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (**1.5 – 2** متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض