
ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الواحد والخمسون للعام 2022

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (522) عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/50 (282) عينة.
2. عدد الحالات المؤكدة (21) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 4 % ، مقارنة بالأسبوع الوبائي 2022/50 (12) حالة مؤكدة وبنسبة إيجابية 4 %.
3. لم يتم التبليغ عن حالات وفاة لهذا الأسبوع.
4. عدد المطعمين ضد فيروس COVID-19 بالجرعة الأولى (2,308,724) مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية (1,229,888) مطعم، عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية (177,468) مطعم.



❖ الاحصائيات التراكمية:

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
507,133	58	500,638	6,437	% 1	جرعة أولى: 2,308,724 جرعة ثانية: 1,229,888 جرعة تعزيزية: 177,468

❖ **الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (2022/50) مقارنة بالأسبوع (2022/51):**

	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	نسبة الإيجابية
الأسبوع 2022/51	522	21	3	0	↓%4
الأسبوع 2022/50	128	9	10	0	%7

❖ **توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 51/ 2022:**

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
	19	20	21	22	23	24	25
عدد الحالات	0	10	4	7	---	0	0

❖ أعلى حالات مسجلة لهذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس (21 حالات)

❖ **نسبة الإيجابية حسب المناطق لهذا الأسبوع:**


	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
الاسبوع 51 / 2022	%0	%4	%0
الاسبوع 50 / 2022	%0	%8	%0

❖ **حالات الشفاء خلال الأسبوع 51/ 2022:**

إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 3 حالات.

❖ **حالات الوفاة خلال الأسبوع (2022/50) مقارنة بالأسبوع (2022/51) :**

	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المجموع
الأسبوع 51 / 2022	0	0	0	0
الأسبوع 50 / 2022	0	0	0	0



❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

المدينة	عدد الحالات المؤكدة	
	الأسبوع 2022/50	الأسبوع 2022/51
طرابلس	4	16
صبراتة	5	5

إرشادات عامة للوقاية من الإصابة

- الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد - 19 .
- الابتعاد عن مصدر العدوى.
- التهوية الجيدة.
- ارتداء الكمامة.
- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (**1.5** – **2** متر).
- في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com **Telephone:** +218 514 62 62 02

Facebook/إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض