# التقرير الوبائي ( 2022/07/07 )

## الوضع الوبائي العالمي

للاسبوع الرابع يستمر نمط الارتفاع في العدد الكلي للحالات حيث سجلت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات بلغ 3 % و انخفاض في الوفيات بلغ 12 % عما سجل الاسبوع الماضي . باستثناء منطقتي الامريكتين و افريقيا سجلت باقي المناطق ارتفاعات متفاوتة في عدد الحالات تتصدرها منطقتي شرق المتوسط و جنوب شرق اسيا بارتفاع بلغ 29% و 20% عما سجل في الاسبوع الماضي. وياتي هذا الارتفاع نتيجة لانتشار المتحورات الفرعية لمتحور اوميكرون (BA 4 , BA 5, BA 2) وتصدرهم المشهد الوبائي والتي تتميز بسرعة الانتشار . وقد رصدت المنظمة دخول الموجة الحالية للوباء منذ شهر مايو الماضي ابتداءً بامريكا الشمالية وجنوب افريقيا و استراليا وتلتها اوروبا وحاليا مناطق شرق المتوسط و جنوب شرق اسيا. وتشير المؤشرات الوبائية الى ضعف القدرة الامراضية لهذه المتحورات و يعكس هذا الانخفاض النسبي في عدد الوفيات و عدد المرضى في المستشفيات.

## دول نقاط العبور (Trauel Corridor Covntries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى.

| الدولة | المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مو | التغير الاسبوعي( WK3 |
|---|---|---|
| ليبيا | >1 | 13 % |
| تونس | 11 | 514% |
| مصر | >1 | - |
| الجزائر | >1 | 97% |
| السودان | >1 | 81% |
| تشاد | >1 | - |
| النيجر | >1 | - |
| تركيا | 13 | 1,153% |

# الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية ارتفاعا مطرداً في عدد الحالات خلال الاسابيع الاربعة السابقة حيث بلغت الزيادة الاسبوعية في نسبة الحالات الموجبة اكثر من 10 %. وقد تزامن هذا مع ارتفاع قياسي في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 35 % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي. في حين سجلت جمهورية مصر استقراراً في عدد الحالات .



# الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية **502,289** حالة و عدد الوفيات **6,430** حالة وفاة . واعتماداً على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **حالة واحدة** يوميا.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 207 اختبار يوميا وقد رافق ذلك ارتفاع في عدد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 17 حالات يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بارتفاع بلغ 96 % . و ارتفع مؤشر نسبة الحالات الموجبة الى 8 % نهاية هذا الاسبوع.

ولم تسجل مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني لي حالة وفاة مع استقرار مؤشر معدل الوفيات (CFR) .%1.34

# الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

تشهد المناطق الصحية في ليبيا انخفاض في عدد الحالات المسجلة اسبوعياً. و لم تتخطى اي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 الف مواطن وبلغت عدد المناطق التي سجلت حالات اصابة الى 3 مناطق بتسجيل حالة واحدة الى حالتين في كل منهما لكل 100 الف مواطن.



| المنطقة | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الجبل الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بنغازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجدابيا والملواحات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الكفرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سرت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصراته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرقب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| طرابلس | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| الجفارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الزاوية | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| المنطقة الغربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الجبل الغربي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نالوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الجفرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وادي الشاطئ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سبها | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| وادي الحياة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرزق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة.

**بانخفاض عدد الحالات المسجلة اسبوعيا لكل 100 الف مواطن و انخفاض عدد الحالات في مراكز العزل تصنف كل المناطق الليبية على المستوى الوبائي الثاني.**



# الخـــلاصـــــة

- تشير المؤشرات الوبائية الى سرعة انتشار المتحورات الفرعية ( BA2, BA4, BA5 ) لمتحور اوميكرون عالميا ووصول الموجة الحالية الى منطقة شرق المتوسط.
- **لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد ينبآ بتغير في الوضع الوبائي و ظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية** وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - ارتفاع مؤشر عدد التكاثر الى اكثر من 1 (1.3) نهاية هذا الاسبوع
  - ارتفاع المعدل الاسبوعي لنسبة الحالات الموجبة الى 8% تزامناً مع انخفاض عدد الاختبارات اشارة الى وجود حالات لا يتم الكشف عنها وضعف القدرة الحالية في الكشف عنها
  - الزيادة الملحوظة في عدد الحالات سجلت نهاية هذا الاسبوع و الذي سجل انخفاض غير مسبوق في عدد الاختبارات والذي قد يشير الى انتشار عنقودي محدود
  - استقرار مؤشر التغيير الاسبوعي ( BIWEEKLY CHANGE ) والذي يؤكد على استمرار استقرار الوضع الوبائي لهاذا الاسبوع.
  - استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشياً مع نمط انتشار المتحور اوميكرون.
- تصنيف كل المناطق على المستوى الوبائي الثاني و لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء وخاصة مع تدني نسبة المطعمين جرعتين (16% فقط) وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددا.
- انخفاض عدد الاختبارات الى اقل من 50 اختبار لكل 100 الف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الامراض من رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء

## التوصيات :

- رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التى تجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة اجهزة المركز في الكشف عن الحالات .
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر
- تكثيف حملات التطعيم والتوعية
- دعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.