التقرير الوبائي (2022/03/10)

الوضع الوبائي العالمي

في اطار الوضع الوبائي العالمي لا تزال منطقة غرب المحيط الهادي تسجل ارتفاع في عدد الحالات المسجلة حيث بلغت الزيادة الاسبوعية 46 % و على الصعيد الاقليمي سجلت منطقة شرق المتوسط انخفاض قياسيا بلغ 46- % تزامن هذا مع تسجيل المنطقة ارتفاع طفيف في اعداد الوفيات بلغت 2 %.

دول نقاط العبور (Trauel Corridor Covntries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت **ليبيا** و**تركيا** و **الاردن** و **مصر** و **مالطا** و**تونس** في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	55	-70 %
تونس	214	-20%
مصر	9	-40 %
الجزائر	1	-80 %
السودان	1	-
تشاد	1	-
النيجر	1	-
تركيا	391	-50 %

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية ارتفاعا طفيف في اعداد الحالات هذا الاسبوع حيث بلغت نسبة الحالات الموجبة 26% نهاية هذا الاسبوع . وقد تزامن هذا مع انخفاض في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 19 % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي. كذلك سجلت جمهورية مصر استقراراً في عدد الحالات .




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية **499,767** حالة و عدد الوفيات **6,336** حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **15** حالة يوميا بانخفاض بلغ 50 % عما سجل الاسيوع الماضي .




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 2,254 اختبار يوميا بانخفاض بلغ 26- % عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك انخفاضاً ملحوظ في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 355 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بانخفاض بلغ 51- % . و انخفض مؤشر نسبة الحالات الموجبة الى 16 % نهاية هذا الاسبوع.

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني استقرار في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 8 حالات يوميا هذا الاسبوع ايضا واستقرار في مؤشر معدل الوفيات (CFR) 1.33%.



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

تشهد معظم المناطق الصحية في ليبيا انخفاض في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. ولاول مرة منذ انتشار الموجة الرابعة تنخفض عدد الحالات المسجلة في **منطقة طرابلس** الى اقل من 200 حالة لكل 100 الف مواطن و لم تتخطى اي منطقة اخرى حاجز 100 حالة لكل 100 الف مواطن ,




المنطقة	04/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	10/03
طبرق	5	5	4	0	0	1	1
درنة	4	4	4	1	1	1	1
الجبل الأخضر	6	5	6	5	4	3	4
المرج	8	8	15	15	15	13	12
بنغازي	2	3	4	4	4	4	3
اجدابيا والواحات	7	2	5	5	4	6	6
الكفرة	32	36	20	13	16	11	7
سرت	30	32	25	20	18	15	12
مصراته	26	23	22	17	15	13	12
المرقب	94	79	74	64	56	44	41
طرابلس	238	211	186	176	152	132	125
الجفارة	58	47	37	28	33	23	17
الزاوية	108	88	80	86	36	32	29
المنطقة الغربية	65	48	49	43	36	31	27
الجبل الغربي	27	21	23	22	21	19	15
نالوت	77	52	41	32	32	19	26
الجفرة	117	56	30	30	30	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	1	1	1
سبها	11	10	53	54	55	55	53
وادي الحياة	8	7	4	4	0	0	0
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	11	10	7	6	7	6	5

المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة.

باستثناء منطقة طرابلس والتي صنفت على المستوى الوبائي الثالث, صنفت كل المناطق الليبية على المستوى الوبائي الثاني



الخـــلاصـــــة

- تصنيف معظم المناطق على المستوى الوبائي الثاني مؤشر الى خروج البلاد من الموجة الرابعة و لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء وخاصتا مع تدني نسبة المطعمين جرعتين (16% فقط) وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددا.

- استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي وتباطئ سرعة انتشار الموجة الرابعة في البلاد وذلك للاعتبارات التالية:
  - انخفاض مؤشر عدد التكاثر الى (0.68) نهاية هذا الاسبوع واستقراره تحت (1) لاكثر من اربعة اسابيع متتاليين اشارة الى استقرار الوضع الوبائي.
  - انخفاض نسبة الحالات الموجبة الى 16 % تزامناً مع انخفاض عدد الاختبارات اشارة الى تباطئ انتشار المرض في المجتمع.
  - استقرار معدل الوفيات 1.33 تماشياً مع نمط انتشار الموجة الرابعة

التوصيات :

- تحسن الوضع الوبائي المحلي و خروج البلاد من الموجة الرابعة و تصنيف معظم المناطق على المستوى الوبائي الثاني يدعوا الى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم و تفعيل القوانين المنظمة لاجبارية التطعيم للوصول بالبلاد الى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء
- استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة .
- توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- استمرار العمل بالاجراءات الاحترازية في اماكن العمل و مراكز التسوق والاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.
- البدء في وضع (خطة خروج) و التخفيض التدريجي للاجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض, مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة الامنة من المطعمين.

د. طارق محمد جبريل
أستاذ علم الاوبئة الجزيئي
كلية الطب - جامعة طرابلس