التقرير الوبائي (2022/07/14)

الوضع الوبائي العالمي

يستمر نمط ارتفاع عدد الحالات عالمياً حيث سجلت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات بلغ 6 % و انخفاض في الوفيات بلغ 2 % عما سجل الاسبوع الماضي . في حين تشهد منطقتي اوروبا و امريكا تباطء في انتشار المرض سجلت منطقة غرب المحيط الهادي و منطقة شرق المتوسط اعلى معدلات زيادة في عدد الحالات هذا الاسبوع حيث بلغت 28% في منطقة غرب المحيط الهادي و 25% في منطقة شرق المتوسط. وياتي هذا الارتفاع نتيجة لانتشار المتحورات الفرعية لمتحور اوميكرون (BA 4 , BA 5, BA 2) وتصدرهم المشهد الوبائي والتي تتميز بسرعة الانتشار وتشير المؤشرات الوبائية الى ضعف القدرة الامراضية لهذه المتحورات و يعكس هذا الانخفاض النسبي في عدد الوفيات و عدد المرضى في المستشفيات.

دول نقاط العبور (Trauel Corridor Covntries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مو	التغير الاسبوعي(WK3
ليبيا	14	144 %
تونس	405	349%
مصر	-	-
الجزائر	1	110%
السودان	>1	27%
تشاد	>1	-
النيجر	>1	-
تركيا	197	364%

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية ارتفاعا مطرداً في عدد الحالات خلال الاسابيع الاربعة السابقة حيث بلغت نسبة الحالات الموجبة 52% بزيادة الاسبوعية 8 % عما سجل الاسبوع الماضي. وقد تزامن هذا مع ارتفاع قياسي في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 43 % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي. في حين سجلت جمهورية مصر استقراراً في عدد الحالات .



الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية **502,642** حالة و عدد الوفيات **6,431** حالة وفاة . واعتماداً على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **ستة حالات** يوميا.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع انخفاض في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 167 اختبار يوميا وقد رافق ذلك ارتفاع في عدد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 88 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بارتفاع بلغ 253 % . و ارتفع مؤشر نسبة الحالات الموجبة الى 36 % نهاية هذا الاسبوع.

وسجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني حالة وفاة واحدة هذا الاسبوع مع استقرار مؤشر معدل الوفيات (CFR) 1.34%.

الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

لا تزال معظم المناطق الصحية تشهد استقرار في عدد الحالات المسجلة اسبوعياً. و لم تتخطى اي اي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 الف مواطن وارتفع عدد المناطق التي سجلت حالات اصابة الى 7 مناطق..



المنطقة	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
طبرق	0	0	0	0	0	0	0
درنة	0	0	0	0	0	0	0
الجبل الأخضر	0	0	0	0	0	0	0
المرج	0	0	0	0	0	0	0
بنغازي	0	0	0	0	0	0	0
اجدابيا والملواحات	0	0	0	0	0	0	0
الكفرة	0	0	0	0	0	0	0
سرت	0	0	0	0	0	0	0
مصراته	0	0	0	0	0	0	0
المرقب	0	0	0	0	0	0	2
طرابلس	7	6	6	8	12	16	22
الجفارة	0	0	0	0	0	0	0
الزاوية	1	1	1	1	2	4	10
المنطقة الغربية	0	0	0	1	1	1	4
الجبل الغربي	0	0	0	0	0	0	0
نالوت	0	0	0	1	1	1	2
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	2
سبها	1	1	1	3	3	3	3
وادي الحياة	0	0	0	0	0	0	0
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	0	0	0	0	0	0	0

المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة.

نتيجة لارتفاع عدد الحالات المسجلة في طرابلس وانخفاض عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يوميا و اغلاق اغلب مراكز العزل في المنطقة تم تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث في يستمر تصنيف باقي المناطق على المستوى الوبائي الثاني.



الخـــلاصـــــة

- تشير المؤشرات الوبائية الى سرعة انتشار المتحورات الفرعية (BA2, BA4, BA5) لمتحور اوميكرون عالميا واستمرار انتشارها في دول منطقة شرق المتوسط.
- **تشهد البلاد ظهوربؤرجديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية** وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - ارتفاع مؤشر عدد التكاثر الى اكثر من 1 (1.8) نهاية هذا الاسبوع
  - ارتفاع المعدل الاسبوعي لنسبة الحالات الموجبة الى 36% تزامناً مع انخفاض عدد الاختبارات اشارة ضعف القدرة الحالية لاجهزة الرصد والتقصي في الكشف عن الحالات
  - تضاعف مؤشر التغيير الاسبوعي (BIWEEKLY CHANGE) لهاذا الاسبوع مؤشر الى سرعة انتشار المرض في مدينة طرابلس و المناطق المجاورة.
  - استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشياً مع نمط انتشار المتحور اوميكرون.
- **تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث يدعوا الى فرض بعض الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.**
- انخفاض عدد الاختبارات الى اقل من 50 اختبار لكل 100 الف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الامراض من رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء

التوصيات :

- **إعادة فرض الاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الاماكن العامة و التباعد الجسدي في منطقة طرابلس.**
- سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التى تجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة اجهزة المركز في الكشف عن الحالات .
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر .
- اعادة تاهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس و دعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- تكثيف حملات التطعيم والتوعية