المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي (2022/01/20)

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ20/ 01/ 2022م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 18/ 01/ 2022م.

الوضع الوبائي العالمي:

يستمر نمط انتشار المتحور اوميكرون في السيطرة على الوضع الوبائي العالمي حيث يتميز بسرعة انتشار عالية و استقرار في اعداد الوفيات وعليه فقد سجلت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع ارتفاعاً في اعداد المصابين بنسبة بلغت (20٪) عما تم تسجيله الاسبوع الماضي ,فبعد انحسار الموجة عن منطقة افريقيا و تباطئ الانتشار في الامريكتين واوروبا و تتصدر الزيادات الاسبوعية منطقة جنوب شرق اسيا حيث بلغت 145٪ تليها منطقة شرق المتوسط بنسبة بلغت 68٪ عما سجل الاسبوع الماضي, و يتزامن هذا مع تسجيل المنظمة زيادة طفيفة في اعداد الوفيات بلغت 4٪.

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)

تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت تركيا و الاردن و مصر و مالطا في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى ليبيا وتونس على المستوى الثالث.


الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	118	10 %
تونس	650	490%
مصر	12	30 %
الجزائر	20	90 %
السودان	13	390 %
تشاد	3	-
النيجر	1	-
تركيا	781	80 %
الاردن	445	90%
مالطا	723	-50 %

و تشهد كل من تونس و تركيا زيادات اسبوعية مقلقة في اعداد الاصابات تزامناً مع انتشار متحور اوميكرون وعليه يجب فرض اجراءات احترازية اضافية على القادمين من هذه الدول.

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

لا تزال الجمهورية التونسية تشهد للاسبوع الثالث زيادات تضاعفية في اعداد الحالات حيث بلغ معدل الحالات اليومية نهاية هذا الاسبوع 9787 حالة مقارنتا بعدد الحالات اليومية الاسبوع الماضي 6562 حالة يوميا و نسبة الحالات الموجبة 34٪ نهاية هذا الاسبوع مقارنتا 28٪ نهاية الاسبوع الماضي. وقد تزامن هذا مع زيادة في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغت 30٪ عما سجل نهاية الاسبوع الماضي. كما سجلت جمهورية مصر ارتفاعا في عدد الحالات بلغ 36 ٪ مقارنتا بالاسبوع الماضي .




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية 403,144 حالة و عدد الوفيات 5,907 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة 11,045 حالة نهاية هذا الاسبوع بارتفاع بلغ 31 ٪ عن الاسبوع الماضي. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 335 حالة بارتفاع بلغ 87 ٪ عن الاسبوع الماضي.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع ارتفاغا في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 5,252 اختبار يوميا بانخفاض بلغ 22 ٪ عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك ارتفاعا ملحوظاً في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 956 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي وبزيادة بلغت ٪87 . و ارتفع مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 18 ٪ نهاية هذا الاسبوع.

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني ارتفاع في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 13 حالات يوميا واستقر مؤشر معدل الوفيات (CFR) عند ٪1.55.




استنادا على النمط المسجل عالميا لانتشار الموجة الحالية و الوضع الوبائي الاقليمي فان المؤشرات الوبائية المحلية تشير الى بدأ تدهور الوضع الوبائي ايذاناً بدخول الموجة الرابعة للوباء ,حيث ارتفع مؤشر عدد التكاثر الى 1.05 نهاية هذا الاسبوع لاول مرة منذ ستة اشهر (دخول الموجة الثالثة للوباء)



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:


تشهد المنطقة الغربية للبلاد ارتفاع في عدد الاصابات المسجلة اسبوعياً حيث سجلت طرابليس اكثر من 300 حالة لكل 100 الف مواطن و تزامن هذا مع تسجيل البلدبات المجاورة المرقب و الزاوية والجفارة والجبل الغربي لاكثر من 50حالة لكل 100 الف مواطن. في حبن لم تسجل كلا المنطقتين الشرقية والجنوبية اي زبادات تذكر و ذلك لقلت الاختبارات التي تجرى.



ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

المنطقة	14/01	15/01	16/01	17/01	18/01	19/01	20/01
طبرق	0	0	0	0	0	0	0
درنة	4	4	4	3	3	2	2
الجبل الأخضر	0	0	0	0	1	1	2
المرج	15	12	9	6	10	10	10
بنغازي	1	2	2	2	4	5	6
اجدابيا والواحات	1	2	1	2	2	2	2
الكفرة	4	4	4	4	4	0	0
سرت	13	13	6	12	19	24	36
مصراته	19	21	25	29	29	32	33
المرقب	65	63	63	63	59	65	68
طرابلس	174	192	211	237	277	319	380
الجفارة	28	31	28	36	39	44	54
الزاوية	100	104	97	93	108	106	99
المنطقة الغربية	31	25	20	16	21	24	28
الجبل الغربي	39	45	49	52	45	58	63
نالوت	9	14	14	15	14	13	18
الجفرة	0	2	2	2	2	12	15
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	2	4	6	5	6	7	8
وادي الحياة	2	0	0	0	0	0	0
غات	0	0	0	0	0	0	7
مرزق	2	3	1	2	2	3	3

الخلاصة

- بدأ انحسار الموجة الرابعة في بعض دول العالم تباعاً بحسب تاريخ انتشارها فيها و بدأ انتشارها في منطقتي جنوب شرق اسيا و منطقة شرق المتوسط.
- دخول منطقة شرق المتوسط و دول الجوار الموجة الرابعة حيث سجلت المنطقة زيادة قياسية بلغت 68٪.
- تشهد الجمهورية التونسية زيادة مطردة في عدد الحالات تتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في اعداد المرضى في المستشفيات. ازدياد عدد الحالات في تونس يمثل مصدر قلق كبير لليبيا حيث تؤكد المؤشرات الليبية للوباء على توافق كبير للمنحنيات الوبائية في ليبيا مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم
- بدأ تدهور الوضع الوبائي المحلي ايذاناً بدخول الموجة الرابعة للوباء وذلك للاعتبارات التالية:
  - ارتفاع مؤشر عدد التكاثر الى 1.05 نهاية هذا الاسبوع لاول مرة منذ ستة اشهر (دخول الموجة الثالثة للوباء)
  - ارتفاع نسبة الحالات الموجبة الى 23٪ اشارة الى زيادة انتشار المرض في المجتمع.
  - اجتياز منطقة طرابلس (الاكثر كثافة سكانية) خط 300 حالة اسبوعيا لكل 100,000 مواطن

- تدني عدد الاختبارات التي يتم اجراءها في المنطقة الشرقية و الجنوبية الى اقل من 20 اختبار لكل 100 الف مواطن يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة و على سرعة اجهزة الدولة في اتخاذ الاجراءات المناسبة.

التوصيات:

تكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة القادمة للوباء وذلك بالاتي:

- اطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم.
- توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- العودة لفرض الاجراءات الاحترازية في اماكن العمل و مراكز التسوق والاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.
- استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.