التقرير الوبائي (2022/07/21)

الوضع الوبائي العالمي:

بعد ارتفاعات اسبوعية استمرت لاكثر من شهر , سجلت منظمة الصحة العالمية استقرار في عدد الحالات حيث لم تسجل اي زيادة عن عدد الحالات المسجلة الاسبوع الماضي . في حين سجلت انخفاض طفيف في الوفيات بلغ 1 ٪ عما سجل الاسبوع الماضي . في حين يستمر تباطء انتشار المرض في منطقتي اوروبا و امريكا . وسجلت منطقة شرق المتوسط استقرار في عدد الحالات هذا الاسبوع .

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	23	473 %
تونس	318	148%
مصر	-	-
الجزائر	1	133%
السودان	>1	-
تشاد	>1	-
النيجر	>1	-
تركيا	381	364%

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية تباطء في انتشار المرض حيث بلغت نسبة الحالات الموجبة 46%. وقد تزامن هذا مع ارتفاع في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 19 % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية 503,611 حالة و عدد الوفيات 6,431 حالة وفاة . واعتماداً على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي ستة حالات يوميا.




سجل المركز الوطني هذا الاسبوع ارتفاع في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 402 اختبار يوميا وقد رافق ذلك ارتفاع في عدد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 138 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بارتفاع بلغ 57 % . و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة اعلى 35 % نهاية هذا الاسبوع.

ولم تسجل مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني اي حالة مع استقرار مؤشر معدل الوفيات (CFR)



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:

تستمر الموجة الحالية للمرض في الانتشار لتصل الى تسعة مناطق صحية تضم الغرب والشرق والجنوب الليبي. باستثناء منطقة طرابلس لم تتخطى اي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 الف مواطن .



المنطقة	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07	20/07	21/07
طبرق	0	0	0	0	0	0	0
درنة	0	0	0	0	0	0	0
الجبل الأخضر	0	0	0	0	0	0	0
المرج	0	0	0	0	0	0	0
بنغازي	0	0	0	0	0	0	0
اجدابيا والواحات	0	0	0	0	2	2	2
الكفرة	0	5	13	18	22	23	27
سرت	0	0	0	0	0	0	0
مصراته	0	1	5	8	10	12	12
المرقب	2	2	3	4	6	7	6
طرابلس	22	35	40	45	46	51	54
الجفارة	0	0	0	0	0	0	0
الزاوية	10	11	11	15	17	19	16
المنطقة الغربية	4	7	10	16	16	22	20
الجبل الغربي	0	0	1	1	1	1	1
نالوت	2	2	4	5	6	8	9
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	2	2	2	2	2	2	0
سبها	3	3	10	7	8	10	9
وادي الحياة	0	0	0	0	0	0	0
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	0	0	0	0	0	0	0

المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة.

نتيجة لارتفاع عدد الحالات المسجلة في طرابلس وانخفاض عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يوميا و اغلاق اغلب مراكز العزل في المنطقة تم تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث في يستمر تصنيف باقي المناطق على المستوى الوبائي الثاني.



الخـــلاصـــة:

- بدء استقرارالوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطء معدلات انتشار المرض عن الاسبوع الماضي وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - انخفاض مؤشر التغيير الاسبوعي (WEEKLY CHANGE) لهاذا الاسبوع خاصة في مدينة طرابلس و المناطق المجاورة
  - انخفاض مؤشر عدد التكاثر الى (1.3) نهاية هذا الاسبوع
  - استقرار المعدل الاسبوعي لنسبة الحالات الموجبة على 35% تزامناً مع ارتفاع عدد الاختبارات.
  - استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشياً مع نمط انتشار المتحور اوميكرون.
- تشهد البلاد ظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - ارتفاع عدد المناطق التي سجلت ظهور لحالات كورونا هذا الاسبوع ليشمل مناطق في الغرب والشرق والجنوب الليبي.
  - استمرار مؤشر عدد التكاثر اعلى من 1. (1.3) دليل على استمرار انتشار المرض.
- تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث يدعوا الى فرض بعض الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.
- انخفاض عدد الاختبارات الى اقل من 50 اختبار لكل 100 الف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الامراض من رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء

التـــوصيـــات:

- إعادة فرض الاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الاماكن العامة و التباعد الجسدي في منطقة طرابلس.
- سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التى تجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة اجهزة المركز في الكشف عن الحالات .
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر .
- اعادة تاهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس و دعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- تكثيف حملات التطعيم والتوعية