المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي (2022/01/27)

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ 27 / 01/ 2022م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 25/ 01/ 2022م.

الوضع الوبائي العالمي:

يشهد الوضع الوبائي العالمي تباطئ في انتشار الموجة الحالية للوباء حيث سجلت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع ارتفاعاً في اعداد المصابين بنسبة بلغت (5٪) عما تم تسجيله الاسبوع الماضي ,و اقتصرت الزيادات الاسبوعية على ثلاث مناطق هي جنوب شرق اسيا و شرق المتوسط واوروبا فبعد انحسار الموجة عن منطقتي افريقيا و الامريكتين وغرب المحيط الهادي تتصدر الزيادات الاسبوعية منطقة شرق المتوسط بنسبة بلغت 39٪ عما سجل الاسبوع الماضي, و يتزامن هذا مع تسجيل المنطقة زيادة في اعداد الوفيات بلغت 15٪.

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت تركيا و الاردن و مصر و مالطا وتونس في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى ليبيا على المستوى الثالث.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	303	170 %
تونس	708	200%
مصر	17	700 %
الجزائر	49	240 %
السودان	10	110 %
تشاد	2	-
النيجر	1	-
تركيا	863	20 %
الاردن	850	210%
مالطا	535	-60 %

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية انخفاض في اعداد الحالات هذا الاسبوع نتيجة تباطئ انتشار الوباء حيث بلغ معدل الحالات اليومية نهاية هذا الاسبوع 8000 حالة و نسبة الحالات الموجبة 33٪ . وقد تزامن هذا مع زيادة في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغت 47٪ عما سجل نهاية الاسبوع الماضي. كما سجلت جمهورية مصر ارتفاعا في عدد الحالات بلغ 32 ٪ مقارنتا بالاسبوع الماضي .



الوضع الوبائي في ليبيا


بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية 419,543 حالة و عدد الوفيات 5,993 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة 23,997 حالة نهاية هذا الاسبوع بارتفاع بلغ 117 ٪ عن الاسبوع الماضي. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 98 حالة .



الوضع الوبائي في ليبيا


سجل المركز الوطني هذا الاسبوع ارتفاعا في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 8,213 اختبار يوميا بارتفاع بلغ 56 ٪ عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك ارتفاعا قياسياً في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 2343 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي وبزيادة بلغت ٪145 . و ارتفع مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 28 ٪ نهاية هذا الاسبوع.

سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني استقراراً في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 14 حالات يوميا ومما ادى الى انخفاض في مؤشر معدل الوفيات (CFR) ٪1.52.




الوضع الوبائي في ليبيا

للاسبوع الثاني تشهد البلاد زيادة مضطردة في عدد الحالات المسجلة نتيجة لانتشار الوباء في المناطق الغربية حيث بلغ معدل رقم التكاثر 1.07 نهاية هذا الاسبوع و ارتفعت نسبة الحالات الموجبة الى 28٪ اشارة الى تفاقم انتشار المرض في المجتمع .



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:


تشهد المنطقة الغربية للبلاد ارتفاع في عدد الاصابات المسجلة اسبوعياً حيث سجلت طرابليس اكثر من 900 حالة لكل 100 الف مواطن و تزامن هذا مع تسجيل كل المناطق الغربية لاكثر من 50حالة لكل 100 الف مواطن. في حين لم تسجل اغلب المناطق الشرقية والجنوبية اي زبادات تذكر و ذلك لقلت الاختبارات التي تجرى.



ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

المنطقة	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01
طبرق	0	0	0	0	0	0	0
درنة	2	2	2	2	1	2	5
الجبل الأخضر	2	2	3	3	3	2	2
المرج	10	10	13	15	10	8	12
بنغازي	6	6	5	8	7	9	9
اجدابيا والواحات	2	1	2	2	2	2	2
الكفرة	0	0	0	56	99	99	99
سرت	36	43	47	47	44	61	55
مصراته	33	49	58	71	98	122	156
المرقب	68	81	93	101	120	131	161
طرابلس	380	460	554	682	742	846	914
الجفارة	54	53	68	79	76	82	92
الزاوية	99	134	160	208	192	224	265
المنطقة الغربية	28	35	43	45	39	48	63
الجبل الغربي	63	75	75	86	98	104	110
نالوت	18	20	28	27	44	72	97
الجفرة	15	16	20	20	20	10	18
وادي الشاطئ	0	2	3	6	6	8	14
سبها	8	10	16	53	70	73	97
وادي الحياة	0	0	14	15	16	16	19
غات	7	18	36	36	40	40	43
مرزق	3	2	2	12	19	30	30

الخلاصة::

- بدأ انحسار الموجة الرابعة في بعض دول العالم تباعاً بحسب تاريخ انتشارها فيها و بدأ انتشارها في منطقتي جنوب شرق اسيا و منطقة شرق المتوسط.
- تصدر منطقة شرق المتوسط الموجة الرابعة حيث سجلت المنطقة زيادة بلغت 39٪.
- تباطء انتشار المرض في الجمهورية التونسية رغم تسجيل زيادة ملحوظة في اعداد المرضى في المستشفيات. ازدياد عدد الحالات في تونس يمثل مصدر قلق كبير لليبيا حيث تؤكد المؤشرات الليبية للوباء على توافق كبير للمنحنيات الوبائية في ليبيا مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم
- استمرار انتشار الموجة الرابعة وذلك للاعتبارات التالية:
  - ارتفاع مؤشر عدد التكاثر الى 1.07 نهاية هذا الاسبوع .
  - ارتفاع نسبة الحالات الموجبة الى 28٪ اشارة الى زيادة انتشار المرض في المجتمع.
  - ارتفاع عدد الحالات في المناطق (الاكثر كثافة سكانية) طرابلس اكثر من 900 حالة و الزاوية اكثر من 200 حالة ومصراتة والجبل الغربي 100 حالة اسبوعيا لكل 100,000 مواطن.
  - انخفاض معدل الوفيات الى 1.52 تماشياً مع نمط انتشار الموجة الرابعة

التوصيات:

مجابهة الموجة القادمة للوباء وذلك بالاتي:

- اطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم.
- توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- العودة لفرض الاجراءات الاحترازية في اماكن العمل و مراكز التسوق والاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.
- استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.