التقرير الوبائي (2022/07/28)

الوضع الوبائي العالمي

لاتزال منظمة الصحة العالمية تسجل استقرار في عدد الحالات هذا الاسبوع ايضاً حيث لم تسجل اي زيادة عن عدد الحالات و عدد الوفيات المسجلة الاسبوع الماضي . في حين يستمر تباطء انتشار المرض في منطقتي اوروبا و امريكا .سجلت منطقة شرق المتوسط ارتفاع قياسي في عدد الحالات هذا الاسبوع .لغ 45% عما سجل الاسبوع الماضي ورافق هذا ارتفاع في عدد الوفيات بلغ 88% عما سجل الاسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع عدد الوفيات في كل من ايران وتونس والمغرب.

دول نقاط العبور (Trauel Corridor Covntries)


تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى.

الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مو	التغير الاسبوعي(WK3
ليبيا	28	756%
تونس	167	20%
مصر	-	-
الجزائر	2	212%
السودان	>1	-
تشاد	>1	-
النيجر	>1	-
تركيا	615	364%

الوضع الوبائي في تونس و مصر


نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

تشهد الجمهورية التونسية تباطء في انتشار المرض حيث بلغت نسبة الحالات الموجبة 38%. وقد تزامن هذا مع انخفاض في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغ 44- % عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.




الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية **504,749** حالة و عدد الوفيات **6,431** حالة وفاة . واعتماداً على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **سبعة حالات** يوميا.




بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض بلغت عدد الاصابات الكلية **504,749** حالة و عدد الوفيات **6,431** حالة وفاة . واعتماداً على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية قدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي **سبعة حالات** يوميا.



الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

تستمر الموجة الحالية للمرض في الانتشار لتصل الى 11 منطقة صحية تضم الغرب والشرق والجنوب الليبي. وباستثناء منطقة طرابلس لم تتخطى اي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 الف مواطن .



المنطقة	22/07	23/072	24/072	25/072	26/072	27/072	28/072
طبرق	0	0	0	0	0	0	0
درنة	0	0	0	0	0	0	0
الجبل الأخضر	0	0	0	0	0	0	0
المرج	0	0	0	0	0	0	0
بنغازي	0	0	0	0	0	0	0
اجدابيا والملواحات	2	2	5	5	3	3	3
الكفرة	27	22	14	9	9	7	7
سرت	0	0	1	1	1	1	1
مصراته	12	12	11	8	9	7	8
المرقب	6	8	10	12	12	14	17
طرابلس	54	49	58	63	62	62	60
الجفارة	0	0	0	0	0	0	0
للزاوية	16	18	21	21	19	17	21
المنطقة الغربية	20	21	27	22	22	20	23
الجبل الغربي	1	3	2	3	3	3	4
نالوت	9	11	16	14	14	17	15
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	9	9	5	7	7	6	8
وادي الحياة	0	0	1	1	1	1	1
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	0	0	0	0	0	0	0

المستويات الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و ادارة الطوارئ بوزارة الصحة واستناداً على دليل اجراءات فرض و تخفيف الاجراءات الاحترازية المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الامراض تم اعتماد خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الاجراءات الاحترازية ليتم التعامل مع انتشار الوباء حسب المستوى الوبائي للمنطقة.

نتيجة لارتفاع عدد الحالات المسجلة في طرابلس وانخفاض عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يوميا و اغلاق اغلب مراكز العزل في المنطقة تم تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث في يستمر تصنيف باقي المناطق على المستوى الوبائي الثاني.



الخـــلاصـــــة

- **استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطء معدلات انتشار المرض عن الاسبوع الماضي** وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - انخفاض مؤشر التغيير الاسبوعي (WEEKLY CHANGE) لهاذا الاسبوع خاصة في مدينة طرابلس و المناطق المجاورة
  - انخفاض مؤشر عدد التكاثر الى (1.0) نهاية هذا الاسبوع
  - استقرار المعدل الاسبوعي لنسبة الحالات الموجبة على 36%
  - استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشياً مع نمط انتشار المتحور اوميكرون.
- **تشهد البلاد ظهور بؤر جديدة للمرض بالمناطق المحيطة بالمدن ذات الكثافة السكانية العالية** وتؤكده الاعتبارات التالية:
  - ارتفاع عدد المناطق التي سجلت ظهور لحالات كورونا هذا الاسبوع ليشمل مناطق في الغرب والشرق والجنوب الليبي.
  - استمرار ظهور حالات جديدة في صرمان و المرقب و مناطق الجبل الغربي
  - استمرار مؤشر عدد التكاثر (1.3) دليل على استمرار انتشار المرض.
  - استمرار التزايد
- **تصنيف منطقة طرابلس على المستوى الوبائي الثالث يدعوا الى فرض بعض الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.**
- انخفاض عدد الاختبارات الى اقل من 50 اختبار لكل 100 الف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الامراض من رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء

التـوصـيات :

- **إعادة فرض الاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الاماكن العامة و التباعد الجسدي في منطقة طر ابلس.**
- سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التى تجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة اجهزة المركز في الكشف عن الحالات .
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر .
- اعادة تاهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس و دعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- تكثيف حملات التطعيم والتوعية