المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

التقرير الوبائي (2021/12/30)

اعد هذا التقرير اعتماداً على بيانات المركز الوطني لمكافحة الامراض حتى تاريخ 30 / 12 / 2021م و بيانات منظمة الصحة العالمية حتى تاريخ 28 / 12 / 2021م.

الوضع الوبائي العالمي:

سجلت منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع ارتفاعاً طفيفاً في اعداد المصابين عما تم تسجيله الاسبوع الماضي بنسبة بلغت (11٪) مدفوعة بزيادة قياسية في اعداد الحالات المسجلة في منطقة الامريكتين حيث بلغت 39٪ عما سجل الاسبوع الماضي .في حين انخفضت اعداد الوفيات بنسبة بلغت 4٪ عن الاسبوع الماضي. و يتزامن هذا مع تسجيل منطقة شرق المتوسط انخفاضاً في عدد الحالات والوفيات هذا الاسبوع ايضاً بلغت (3٪ و 7٪)عما سجل الاسبوع الماضي..

دول نقاط العبور (Travel Corridor Countries)

تشكل دول الجوار و بعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي اهمية كبيرة كمصدر اساسي للعدوى. حسب تصنيف مركز مكافحة الامراض الامريكي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر (حيث يتم حساب معدلات الاصابة و عدد الاختبارات مقارنتا بعدد السكان خلال 28 يوما) وبهذا صنفت تركيا و الاردن في مستوى الخطورة الرابع والاكثر خطورة للسفر في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر الى ليبيا وتونس ومصر ومالطا على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم للسفر.


الدولة	المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن	التغير الاسبوعي(WKS2)
ليبيا	86	15 %
تونس	31	60 %
مصر	8	-1 %
الجزائر	7	52 %
السودان	2	-
تشاد	1	-
النيجر	1	-
تركيا	217	16 %
الاردن	326	-69 %
مالطا	2,011	620 %

و تشهد جمهورية مالطا زيادات اسبوعية مقلقة في اعداد الاصابات تزامناً مع انتشار متحور اوميكرون وعليه يجب فرض اجراءات احترازية اضافية على القادمين من مالطا.

الوضع الوبائي في تونس و مصر

نظرا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بالوضع الوبائي في كلا البلدين فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.


تشهد جمهورية مصر استقراراً في الوضع الوبائي حيث سجلت انخفاض طفيف في عدد الحالات بلغ 5 ٪ مقارنتا بالاسبوع الماضي . في حين تشهد الجمهورية التونسية وضعا وبائيا مقلقاَ نتيجة لزيادة في اعداد المصابين حيث بلغت نسبة الحالات ٪11 نهاية هذا الاسبوع. مقارنتا ٪5 نهاية الاسبوع الماضي وقد تزامن هذا مع زيادة في اعداد المرضى بالمستشفيات بلغت 16 ٪ عما سجل نهاية الاسبوع الماضي.



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA


الوضع الوبائي في ليبيا

بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الامراض لا تزال الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي .حيث بلغت عدد الاصابات الكلية 388,183 حالة و عدد الوفيات 5,696 حالة وفاة . واعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض و تقدير عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية ,قد قدرت عدد الحالات النشطة 8,421 حالة نهاية هذا الاسبوع بزيادة بلغت 6 ٪ عن الاسبوع الماضي. وقدرت عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الاسبوع الماضي 204 حالة بزيادة بلغت 12 ٪ عن الاسبوع الماضي.



سجل المركز الوطني هذا الاسبوع زيادة طفيفة في عدد الاختبارات التي تم اجراءها يوميا مقارنتا بالاسبوع الماضي وقد بلغ متوسط الاختبارات الاسبوعي حوالى 5,046 اختبار يوميا بزيادة بلغت 12 ٪ عن الاسبوع السابق وقد رافق ذلك ارتفاع في اعداد الحالات الموجبة المسجلة ,حيث بلغ المتوسط الاسبوعي لعدد الحالات المسجلة 679 حالة يوميا مقارنتاً بعدد الحالات المسجلة في الاسبوع الماضي بزيادة بلغت 12 ٪. و استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط اسبوعي 13 ٪ نهاية هذا الاسبوع ايضاَ.


سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالكورونا التابعة للمركز الوطني ارتفاعاَ في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 12 حالات يوميا واستقر مؤشر معدل الوفيات (CFR) للاسبوغ الخامس عند ٪1.55.



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA


الحالة الوبائية في ليبيا حسب المناطق الصحية:

تشهد معظم المناطق الصحية انخفاضاً او استقراراً في اعداد الحالات المسجلة اسبوعياً. ولا يزال عدد المناطق المسجلة لاكثر من 100 حالة لكل 100 الف مواطن , منطقتين وهي طرابلس والزاوية في حين ارتفع عدد المناطق التي سجلت اكثر من 50 حالة لكل 100 الف مواطن الى ثلاث مناطق وهي الجبل الغربي و المرقب و الجفارة .



ويرجع عدم تسجيل اي حالات في العديد من المناطق الى قلة عدد الاختبارات التي يتم اجراءها يومياً وسوء توزيعها جغرافيا والذي يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

عدد الاختبارات الاسبوعية لكل 100 الف مواطن



عدد الحالات الاسبوعية *(7DRA) لكل 100,000 مواطن في المناطق الليبية:

المنطقة	24/12	25/12	26/12	27/12	28/12	29/12	30/12
طبرق	5	11	11	11	12	14	13
درنة	0	0	0	0	0	0	0
الجبل الأخضر	1	1	1	1	1	1	0
المرج	13	12	10	10	13	9	8
بنغازي	2	1	1	3	3	3	3
اجدابيا والواحات	3	4	5	2	3	2	2
الكفرة	4	4	4	7	9	7	7
سرت	15	23	22	26	23	23	20
مصراته	11	10	10	10	11	11	13
المرقب	79	70	80	80	89	96	86
طرابلس	144	149	157	159	157	167	168
الجفارة	50	56	63	64	68	56	57
الزاوية	154	148	166	169	182	175	158
المنطقة الغربية	26	22	36	41	43	45	41
الجبل الغربي	71	66	61	52	53	53	55
نالوت	16	16	16	15	13	2	1
الجفرة	0	0	0	0	0	0	0
وادي الشاطئ	0	0	0	0	0	0	0
سبها	5	1	2	3	4	10	10
وادي الحياة	1	1	1	1	3	2	2
غات	0	0	0	0	0	0	0
مرزق	3	3	3	3	5	5	3

الخلاصة

- بالرغم من تسجيل زيادات قياسية في اعداد الحالات في بعض البلدان نتيجة دخولها في الموجة الرابعة للوباء الا ان الوضع الوبائي في معظم المناطق الصحية العالمية لا يزال يتمتع باستقرار نسبي.
- بالرغم من سرعة انتشار المتحور اوميكرون عالميا الا ان منطقة شرق المتوسط و دول الجوار لا تزال تتمتع بإستقرار نسبي في الوضع الوبائي.
- تشير المؤشرات الوبائية لدخول جمهورية مالطا في موجة رابعة للوباء قد تكون مرتبطه بانتشار المتحور اوميكرون وعليه يجب فرض اجراءات احترازية اضافية على القادمين من مالطا.
- تشهد الجمهورية التونسية زيادة مقلقة في عدد الحالات تتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في اعداد المرضى في المستشفيات. ازدياد عدد الحالات في تونس يمثل مصدر قلق كبير لليبيا حيث تؤكد المؤشرات الليبية للوباء على توافق كبير للمنحنيات الوبائية في ليبيا مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم
- لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً هذا الاسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد ينبآ بتغير في الوضع الوبائي خلال الاسابيع القليلة القادمة.
- تدني عدد الاختبارات التي يتم اجراءها في المنطقة الشرقية و الجنوبية الى اقل من 20 اختبار لكل 100 الف مواطن يشكل عائقاً لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة و على سرعة اجهزة الدولة في اتخاذ الاجراءات المناسبة.

التوصيات:

- اطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة للتطعيم.
- توسيع وتكثيف حملات التوعية واجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية و الجنوبية
- العودة لفرض الاجراءات الاحترازية في اماكن العمل و مراكز التسوق والاماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.
- استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, و دعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.
- دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق ادارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

د. طارق محمد جبريل
أستاذ علم الاوبئة الجزيئي
كلية الطب - جامعة طرابلس